

THÔNG BÁO

Công tác Trồng trọt và BVTV 7 ngày

(Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

- Nhiệt độ: Trung bình: 28-30°C cao: 37°C thấp: 24°C
- Ẩm độ: Trung bình: 80% cao: 90% thấp: 70%

Trong kỳ, nắng mưa xen kẽ, nhiệt độ và ẩm độ không khí cao. Nhìn chung ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch các cây trồng, đặc biệt là lúa vụ xuân, tuy nhiên là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây hại.

II. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VÀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI

1. Tiến độ sản xuất trồng trọt

- Cây lúa:

+ Lúa vụ xuân: Diện tích 8.787/8.400 ha đạt 105% KH, lúa đang giai đoạn chín – thu hoạch, đã thu hoạch được khoảng 6.695 ha đạt 76%.

+ Lúa vụ mùa: Diện tích cấy được khoảng 1.365 ha, đang giai đoạn bén rễ - hồi xanh.

- Cây ngô:

+ Ngô vụ xuân: Diện tích 8.908/9.000 ha đạt 99% KH, ngô đời giai đoạn trổ cờ - phun râu, ngô ruộng giai đoạn chín – thu hoạch, đã thu hoạch được khoảng 1.450 ha đạt 16%.

+ Ngô vụ mùa: Diện tích đã trồng 931 ha (Ngân Sơn) đang giai đoạn tạo hạt.

- Cây dong riềng: Diện tích 445/820 ha đạt 54% KH, giai đoạn phát triển thân lá - hình thành củ.

- Diện tích trồng mới cây ăn quả: Cây cam, quýt 76/180 ha đạt 42% KH; cây mơ 62/160 ha đạt 39% KH.

- Các cây trồng khác: Cây lạc 263/260 ha đạt 101% KH, cây khoai môn 186/280 ha đạt 66% KH, cây khoai lang 274/200 ha đạt 137% KH, cây rau 1.667/1.500 ha đạt 111% KH, cây đậu đỗ 278/300 ha đạt 93% KH, cây đậu tương 208/170 ha đạt 122% KH, cây mía 87/70 ha đạt 124% KH, cây gừng 188/300 ha đạt 63% KH, cây nghệ 101/125 ha đạt 80% KH,...

2. Tình hình dịch hại

- Lúa mùa: Bệnh đạo ôn lá, bọ rầy gây hại nhẹ, rải rác trên mạ; Ốc bươu vàng gây hại nhẹ, rải rác trên lúa mùa sớm giai đoạn cấy – hồi xanh

- Trên các cây trồng khác: Sâu bệnh gây hại nhẹ, rải rác, mật độ sâu và tỷ lệ bệnh hại không đáng kể.

- Châu chấu tuổi 3-4 gây hại nhẹ, rải rác trên những diện tích bị hại năm trước tại các xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tại huyện Na Rì châu chấu đang di chuyển.

III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TUẦN TỚI

1. Cây lúa

- Lúa xuân: Tập trung nhân lực, công cụ khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa còn lại, đồng thời tiến hành công tác vệ sinh đồng ruộng, thu gom rơm rạ và tàn dư cây trồng trên đồng ruộng để tiếp tục gieo trồng vụ mùa.

- Lúa mùa

+ Mùa sớm: Giai đoạn đẻ nhánh, tiến hành làm cỏ, điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng.

+ Mùa chính vụ: Chăm sóc, giữ đủ ẩm cho ruộng mạ, cấy khi mạ đạt 2-3 lá tiến hành cấy. Trước khi cấy cần bón lót với lượng phân tính cho 1.000 m²: Phân chuồng hoai mục 800 - 1.000 kg + 40 - 50 kg phân lân. Nếu đất chua bón thêm 40 - 50 kg vôi bột. Khi lúa hồi xanh – đẻ nhánh, tiến hành bón thúc lần 1 (thúc đẻ nhánh) khi cây lúa bén rễ - hồi xanh (sau cấy 5-7 ngày), kết hợp làm cỏ, sục bùn, lượng phân bón tính cho 1.000 m²:

Đối với lúa thuần: Bón 12 - 14 kg đạm urê + 4 - 5 kg Kali.

Đối với lúa lai: Bón 16 - 18 kg đạm urê + 5 - 6 kg Kali.

- Dự báo dịch hại và biện pháp phòng trừ:

+ Trên mạ: Bệnh đạo ôn lá, bọ rầy gây hại nhẹ. Những diện tích mạ bị hại, trước khi cấy cần tiến phun trừ và đảm bảo thời gian cách ly khi cấy.

Bệnh đạo ôn lá: Phun trừ bằng một trong những loại thuốc như: Fuji-one 40EC, Filia 525SE, Kasai 21,2WP, Beam 75WP...

Bọ rầy Phun trừ bằng một trong những thuốc có tác dụng nội hấp, lưu dẫn, gây ngán ăn, điều hòa sinh trưởng côn trùng như: Chess[®] 50WG, Dragoncin 625WP, Bạch Hồ 150EC, Applaud 10WP....

- Trên lúa: Ốc bươu vàng, bệnh nghệt rễ, bọ rầy gây hại nhẹ, rải rác trên những diện tích lúa mới cấy – hồi xanh- đẻ nhánh. Cần chủ động phòng trừ.

Ốc bươu vàng: Làm lưới chắn khi cho nước vào ruộng, vét rãnh trong ruộng để ốc tập trung vào trong rãnh và nhặt ốc đem tiêu hủy; với diện tích mật độ ốc cao tiến hành phun bằng một trong các loại thuốc sau: HN-Samole 700WP, Dioto^r 830WDG.

Bệnh nghệt rễ: Tháo nước, sục bùn, phơi ruộng 2-3 ngày, bón vôi bột 40-50 kg/1000 m². Sau khi xử lý từ 3-5 ngày, tiến hành kiểm tra nếu thấy cây lúa ra rễ

trắng mới và ra thêm lá mới thì sử dụng các loại phân bón qua lá như Thiên Nông, Đầu Trâu hoặc KOMIC để phun, giúp cây lúa nhanh hồi phục.

2. Cây ngô: Phát quang bờ bụi hạn chế chuột gây hại, tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch, đồng thời tiến hành công tác vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây trồng trên đồng ruộng để tiếp tục gieo trồng vụ mùa.

3. Cây dong riềng: Đối với những diện tích sau trồng 4 - 5 tháng, bón phân thúc lần 2 để cây sinh trưởng tốt, lượng phân tính cho 1000 m²: Đạm urê 7 - 10 kg + kali clorua 10 - 15 kg, (lượng đạm có thể giảm hoặc không bón nếu thấy cây tốt), kết hợp xới nhẹ, làm sạch cỏ để cây sinh trưởng tốt.

Chú ý phòng trừ *Bệnh thối thân, bệnh cháy lá ...* gây hại

4. Cây cam quýt

- Đối với những diện tích thời kỳ kiến thiết cơ bản: Cắt tỉa và tạo hình cho cây để cây có bộ tán tốt và bón phân nhiều lần trong năm (2 tháng/lần) để tạo cho cây ra lộc tốt (lượng phân tính cho 10 cây) như sau:

+ Cây 1 năm tuổi: 1 kg đạm + 0,3 kg lân + 0,2 kg kali.

+ Cây 2 năm tuổi: 3 kg đạm + 0,7 kg lân + 0,4 kg kali.

- Đối với những diện tích thời kỳ kinh doanh: Phát quang bờ bụi.

- Chú ý phòng trừ bọ xít xanh *Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa, sâu đục thân, bọ xít xanh ...* gây hại.

5. Châu chấu tre lưng vàng: Tiếp tục điều tra, theo dõi tình hình gây hại và di chuyển của đàn châu chấu. Đặc biệt chú ý những diện tích lúa, ngô, dong riềng ven rừng có nguy cơ châu chấu gây hại./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);
- UBND các huyện, Thành phố;
- Cục Bảo vệ thực vật (B/c);
- Trung tâm BVTV Phía Bắc (B/c);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố (T/h);
- Phòng NN/Phòng kinh tế (P/hợp);

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Hoàng Thanh Bình