

## **THÔNG BÁO**

### **Công tác Trồng trọt và BVTV 7 ngày**

*(Từ ngày 08 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2019)*

#### **I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT**

- Nhiệt độ: Trung bình: 27°C                      cao: 34°C                      thấp: 23°C

- Ẩm độ: Trung bình: 75%                      cao: 90%                      thấp: 70%

Trong kỳ, nắng nóng xen kẽ có mưa. Nhìn chung thuận lợi cho công tác thu hoạch các cây trồng vụ xuân và gieo cấy vụ mùa, đồng thời là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây hại.

#### **II. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VÀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI**

##### **1. Tiến độ sản xuất trồng trọt**

- Cây lúa:

+ Lúa vụ xuân: Diện tích 8.787/8.400 ha đạt 105% KH, đã thu hoạch xong.

+ Lúa mùa: Diện tích cấy được khoảng 5.708/14.000 ha KH đạt 41%, trong đó:

Mùa sớm: Diện tích cấy được khoảng 1.676 ha, đang giai đoạn đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ.

Mùa chính vụ: Diện tích cấy được khoảng 4.032 ha, đang giai đoạn cấy – hồi xanh.

- Cây ngô:

+ Ngô vụ xuân: Diện tích 8.908/9.000 ha đạt 99% KH, ngô đời giai đoạn tạo hạt – chắc hạt, ngô ruộng giai đoạn thu hoạch, đã thu hoạch được khoảng 5.190 ha đạt 58%.

+ Ngô vụ mùa: Diện tích đã trồng 1.151 ha, giai đoạn trồng, riêng huyện Ngân Sơn đang giai đoạn tạo hạt – chắc hạt.

- Cây dong riềng: Diện tích 445/820 ha đạt 54% KH, giai đoạn phát triển thân lá - hình thành củ.

- Diện tích trồng mới cây ăn quả: Cây cam, quýt 76/180 ha đạt 42% KH; cây mơ 62/160 ha đạt 39% KH.

- Các cây trồng khác: Cây lạc 263/260 ha đạt 101% KH, cây khoai môn 186/280 ha đạt 66% KH, cây khoai lang 274/200 ha đạt 137% KH, cây rau 1.667/1.500 ha đạt 111% KH, cây đậu đỗ 278/300 ha đạt 93% KH, cây đậu tương 208/170 ha đạt 122% KH, cây mía 87/70 ha đạt 124% KH, cây gừng 188/300 ha đạt 63% KH, cây nghệ 101/125 ha đạt 80% KH,...

##### **2. Tình hình dịch hại**

- Cây lúa:

+ Ốc bươu vàng, mật độ hại phổ biến 1 con/m<sup>2</sup>, cao 10 con/m<sup>2</sup>, cá biệt 20 con/m<sup>2</sup>; tổng diện tích nhiễm 22 ha tại huyện Chợ Mới, Pác Nặm, Bạch Thông, trong đó nhiễm nhẹ 13 ha, nhiễm trung bình 6,5 ha, nhiễm nặng 2,5 ha; bà con nông dân đã phun trừ phòng được 53 ha.

+ Bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ trên giống BC15 tại huyện Pác Nặm, tỷ lệ bệnh hại cá biệt 10% lá; diện tích nhiễm nhẹ 0,1 ha, bà con nông dân đã phun trừ toàn bộ diện tích nhiễm.

+ Trên mạ: Bệnh đạo ôn lá, bọ rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ, rải rác.

- Cây gừng: Bệnh thối nhũn củ gây hại tỷ lệ phổ biến 0,5-1%, cao 3%; tổng diện tích nhiễm nhẹ khoảng 0,5ha tại huyện Chợ Đồn, bà con nông dân đã phun trừ toàn bộ diện tích nhiễm.

- Trên các cây trồng khác: Sâu bệnh gây hại nhẹ, rải rác, mật độ sâu và tỷ lệ bệnh hại không đáng kể.

- Châu chấu tre lưng vàng gây hại mật độ phổ biến 80-100 con/m<sup>2</sup>, cao > 300 con/m<sup>2</sup>, gây hại trên những diện tích bị hại năm trước hiện nay đã ăn trụi một số diện tích rừng vầu, chưa phát hiện gây hại trên cây trồng nông nghiệp. UBND xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn đang tiến hành phun trừ khoanh vùng những khu vực giáp ranh với cây trồng nông nghiệp bằng máy phun dạng khói. Tuy nhiên do địa hình đồi núi dốc, rừng tự nhiên rậm rạp nên việc phun trừ gặp nhiều khó khăn.

### **III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TUẦN TỚI**

#### **1. Cây lúa**

- Lúa mùa

+ Mùa sớm: Giai đoạn đẻ nhánh rộ, điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện để cho rễ mọc dài, tỏa rộng và bám sâu tăng khả năng hút dinh dưỡng.

+ Mùa chính vụ: Chăm sóc, giữ đủ ẩm cho ruộng mạ, cấy khi mạ đạt 2-3 lá tiến hành. Trước khi cấy cần bón lót với lượng phân tính cho 1.000 m<sup>2</sup>: Phân chuồng hoai mục 800 - 1.000 kg + 40 - 50 kg phân lân. Nếu đất chua bón thêm 40 - 50 kg vôi bột. Khi lúa hồi xanh – đẻ nhánh, tiến hành bón thúc lần 1 (thúc đẻ nhánh) khi cây lúa bén rễ - hồi xanh (sau cấy 5-7 ngày), kết hợp làm cỏ, sục bùn, lượng phân bón tính cho 1.000 m<sup>2</sup>:

Đối với lúa thuần: Bón 12 - 14 kg đạm urê + 4 - 5 kg kali clorua.

Đối với lúa lai: Bón 16 - 18 kg đạm urê + 5 - 6 kg kali clorua.

- Dự báo dịch hại và biện pháp phòng trừ:

+ Trên mạ: Bệnh đạo ôn lá, bọ rầy gây hại nhẹ. Những diện tích mạ bị hại, trước khi cấy cần tiến hành phun trừ và đảm bảo thời gian cách ly khi cấy.

Bệnh đạo ôn lá: Phun trừ bằng một trong những loại thuốc như: Fuji-one 40EC, Filia 525SE, Kasai 21,2WP, Beam 75WP...

Bọ rầy phun trừ bằng một trong những thuốc có tác dụng nội hấp, lưu dẫn, gây ngán ăn, điều hòa sinh trưởng côn trùng như: Chess<sup>®</sup> 50WG, Dragoncin 625WP, Bạch Hồ 150EC, Applaud 10WP....

+ Trên lúa: Bệnh đạo ôn lá, bệnh nghệt rễ, ốc bươu vàng, bọ rầy gây hại nhẹ, rải rác trên những diện tích lúa mới cấy – hồi xanh, đẻ nhánh. Cần chủ động phòng trừ.

Bệnh đạo ôn lá: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện bệnh dừng bón đạm, không phun thuốc kích thích. Duy trì mức nước trong ruộng vừa phải (3-4 cm); sử dụng 1 trong những loại thuốc như Kasai 21,2WP, Kabeam 75WP, Beam 75WP, Fuji-one 40EC. Nếu bệnh gây hại nặng cần phun kép 2 lần, cách nhau 5 -7 ngày.

Ốc bươu vàng: Làm lưới chắn khi cho nước vào ruộng, vét rãnh trong ruộng để ốc tập trung vào trong rãnh và nhặt ốc đem tiêu hủy; với diện tích mật độ ốc cao tiến hành phun bằng một trong các loại thuốc sau: HN-Samole 700WP, Dioto<sup>†</sup> 830WDG.

Bệnh nghệt rễ: Tháo nước, sục bùn, phơi ruộng 2-3 ngày, bón vôi bột 40-50 kg/1000 m<sup>2</sup>. Sau khi xử lý từ 3-5 ngày, tiến hành kiểm tra nếu thấy cây lúa ra rễ trắng mới và ra thêm lá mới thì sử dụng các loại phân bón qua lá như Thiên Nông, Đầu Trâu hoặc KOMIC để phun, giúp cây lúa nhanh hồi phục.

**2. Cây ngô:** Phát quang bờ bụi hạn chế chuột gây hại, tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch, đồng thời tiến hành công tác vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây trồng trên đồng ruộng để tiếp tục gieo trồng vụ mùa.

**3. Cây dong riềng:** Đối với những diện tích sau trồng 4 - 5 tháng, bón phân thúc lần 2 để cây sinh trưởng tốt, lượng phân tính cho 1000 m<sup>2</sup>: Đạm urê 7 - 10 kg + kali clorua 10 - 15 kg, (lượng đạm có thể giảm hoặc không bón nếu thấy cây tốt), kết hợp xới nhẹ, làm sạch cỏ để cây sinh trưởng tốt.

Chú ý phòng trừ *Bệnh thối thân, bệnh cháy lá ...* gây hại

**4. Cây Gừng:** Với thời tiết nóng ẩm cần chú ý phòng trừ bệnh thối nhũn củ, khi phát hiện một vài cây bị bệnh trên ruộng, nên đào cây lên, đem toàn bộ cây và đất ra khỏi ruộng, sau đó dùng vôi rắc vào hố để khử độc. Tránh bỏ những cây bị bệnh xuống nguồn nước tưới. Sử dụng thuốc Kasuran 47WP, Starner 20WP để phun trừ.

### **5. Cây cam quýt**

- Đối với những diện tích thời kỳ kiến thiết cơ bản: Cắt tỉa và tạo hình cho cây để cây có bộ tán tốt và bón phân nhiều lần trong năm (2 tháng/lần) để tạo cho cây ra lộc tốt (lượng phân tính cho 10 cây) như sau:

+ Cây 1 năm tuổi: 1 kg đạm urê + 0,3 kg lân supe + 0,2 kg kali clorua.

+ Cây 2 năm tuổi: 3 kg đạm urê + 0,7 kg lân supe + 0,4 kg kali clorua.

- Đối với những diện tích thời kỳ kinh doanh: Phát quang bờ bụi.

- Chú ý phòng trừ *bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa, sâu đục thân, bọ xít xanh ...* gây hại.

**6. Châu chấu tre lưng vàng:** Tiếp tục điều tra, theo dõi tình hình gây hại và di chuyển của đàn châu chấu. Đặc biệt chú ý những diện tích lúa, ngô, dong riềng ven rừng có nguy cơ châu chấu gây hại.

Biện pháp phun trừ:

+ Phát quang đồi rừng xung quanh diện tích lúa, ngô, dong riềng ven rừng bị châu chấu gây hại.

+ Tại các ổ châu chấu mới nở, còn co cụm mật độ thấp thì dùng vợt bắt thủ công đem tiêu hủy.

+ Tại các ổ châu chấu mới nở có mật độ cao hoặc khi châu chấu có nguy cơ di chuyển xuống gây hại lúa, ngô, dong riềng và cây trồng khác cần tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Gà nòi 95SP, Pattox 95SP, Wavotox 585 EC, Sherpa 25EC...

Nên tổ chức thành các tổ, đội dịch vụ phun tập trung, dùng bình phun ắc quy hoặc máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch, phun cuốn chiếu từng khu vực để tiêu diệt tránh chúng phát tán gây hại trên diện rộng rất khó kiểm soát.

**Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);
- UBND các huyện, Thành phố;
- Cục Bảo vệ thực vật (B/c);
- Trung tâm BVTV Phía Bắc (B/c);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố (T/h);
- Phòng NN/Phòng kinh tế (P/hợp);

*Gửi bản giấy:*

- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Hoàng Thanh Bình**