

+ Bọ rầy: Gây hại nhẹ rải rác, mật độ phổ biến 100 - 150 con/m², cao 400 - 500 con/m²

+ Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh nghệt rễ, bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại nhẹ.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại mật độ cao 8-10 con/m², cá biệt 20 con/m²; tổng diện tích nhiễm 21,8 ha (nhiễm mới 19 ha) tại huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Thành phố, trong đó nhiễm nhẹ 13,2 ha, trung bình 5,3 ha, nặng 3,3 ha; bà con nông dân diệt trừ sâu bằng các biện pháp thủ công và phun thuốc hóa học toàn bộ diện tích nhiễm.

- Cây gừng: Bệnh thối nhũn củ gây hại tại huyện Chợ Mới, tỷ lệ hại phổ biến 2%, cao 10%, cá biệt 22%; tổng diện tích nhiễm khoảng 10 ha (nhiễm mới 4 ha), trong đó nhiễm nhẹ 5 ha, trung bình 3 ha, nặng 2 ha; những diện tích thối củ bà con nông dân đang thu hoạch gừng non và một số hộ đã nhổ bỏ cây bị bệnh, rắc vôi xung quanh gốc bị bệnh.

- Cây khoai môn: Bệnh cháy lá gây hại nhẹ tại huyện Chợ Mới, tỷ lệ phổ biến 5%, cao 12%, cá biệt 30%; tổng diện tích nhiễm nhẹ 5 ha, trong đó nhiễm nhẹ - trung bình 4 ha, nặng 1 ha.

III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TUẦN TỚI

1. Cây lúa

- Mùa sớm: Giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm đến khi lúa chín đở đuôi.

- Mùa chính vụ: Điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện để cho rễ mọc dài, tỏa rộng và bám sâu tăng khả năng hút dinh dưỡng; hướng dẫn bón thúc lần 2 (bón đón đòng) khi lúa xuất hiện khối sơ khởi, giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm, lượng phân tính cho 1.000m².

Đối với lúa thuần: bón 6 – 8 kg Phân đạm urê + 10 - 11 kg Kali.

Đối với lúa lai: bón 7 – 9 kg Phân đạm urê + 12 - 13 kg Kali.

- Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân, bọ rầy.

+ Bệnh đạo ôn lá: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện bệnh dừng bón đạm, không phun thuốc kích thích. Duy trì mực nước trong ruộng vừa phải (3-4 cm); sử dụng 1 trong những loại thuốc như Kasai 21,2WP, Kabeam 75WP, Beam 75WP, Fuji-one 40EC. Nếu bệnh gây hại nặng cần phun kép 2 lần, cách nhau 5 -7 ngày.

+ Bọ rầy: Kiểm tra ruộng khi thấy mật độ rầy khoảng 20 con/khóm hoặc 3 con/dảnh trở lên thì phun trừ rầy bằng một trong các loại thuốc như: Sachray 200WP, Actara 25WG, Patox 95SP, Gà nòi 95SP, Oshin 20WP... Với những ruộng có mật độ cao cần phun kép 2 lần, cách nhau từ 5→7 ngày; dùng luân phiên các loại thuốc để tránh tính kháng thuốc của Rầy.

2. Cây ngô

Tiếp tục làm đất trồng những diện tích còn lại; bón phân thúc lần 1 khi cây 3 – 4 lá kết hợp làm cỏ, vun gốc, lượng phân bón tính cho 1.000 m²: 8 - 10 kg đạm + 4 - 6 kg kali.

Chú ý phòng trừ Sâu keo mùa thu: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng pha loãng đổ vào nõn cây ngô diệt sâu non, khi mật độ cao sử dụng một trong các loại thuốc như Enasin 32WP, Bitadin WP, Match 050EC.... để phun trừ.

3. Cây Gừng: Thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho bệnh thối nhũn củ gừng phát triển và lây lan. Cần thường xuyên kiểm tra vườn, đòi gừng để phát hiện sớm bệnh hại.

Biện pháp phòng trừ: Làm sạch cỏ, nhổ và thu gom những cây bị bệnh đem ra khỏi vườn, đòi gừng để tiêu hủy. Phun một trong các loại thuốc như: Aliette 800WG, Starnar 20WP, Linacin 40SL, New Kasuran 16.6 WP... Những diện tích bị bệnh nặng cần phun kép 2-3 lần, mỗi lần phun cách nhau 5-7 ngày.

Chú ý: Những vườn, đòi gừng bị bệnh tuyệt đối không được bón phân hoặc phun các loại phân bón qua lá, phân vi sinh, các chất kích thích sinh trưởng. Phun thuốc theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc và tuân thủ kỹ thuật “4 đúng”.

4. Cây dong riềng, cây khoai môn, nghệ: Phát quang bờ bụi, cắt tỉa lá già và chú ý phòng trừ bệnh thối thân, bệnh cháy lá ... gây hại

5. Cây cam quýt

Chú ý phòng trừ *bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa, nhện đỏ, sâu đục thân, bọ xít xanh ...* gây hại./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);
- UBND các huyện, Thành phố;
- Cục Bảo vệ thực vật (B/c);
- Trung tâm BVTV Phía Bắc (B/c);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố (T/h);
- Phòng NN/Phòng kinh tế (P/hợp);

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Bá Quân