

THÔNG BÁO

Công tác Trồng trọt và BVTV 7 ngày

(Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2019)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

- Nhiệt độ: Trung bình: 28°C cao: 34°C thấp: 23°C
- Ẩm độ: Trung bình: 75% cao: 90% thấp: 70%

Trong kỳ, nắng mưa xen kẽ. Nhìn chung thuận lợi cho công tác thu hoạch các cây trồng vụ xuân và gieo cấy vụ mùa, đồng thời là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây hại.

II. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VÀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI

1. Tiến độ sản xuất trồng trọt

- Cây lúa mùa: Diện tích cấy được khoảng 10.635/14.000 ha KH đạt 76%, trong đó:

Mùa sớm: Diện tích cấy được khoảng 1.736 ha, đang giai đoạn đẻ nhánh rộ.

Mùa chính vụ: Diện tích cấy được khoảng 8.899 ha, đang giai đoạn cây – hồi xanh, đẻ nhánh.

- Cây ngô:

+ Ngô vụ xuân: Diện tích 8.908/9.000 ha đạt 99% KH, đang giai đoạn chắc hạt - chín, đã thu hoạch được khoảng 6.640 ha đạt 75%.

+ Ngô vụ mùa: Diện tích đã trồng 1.499/6.000 ha đạt 25% KH, đang giai đoạn trồng – mọc, riêng huyện Ngân Sơn đang giai đoạn chắc hạt - chín.

- Cây dong riềng: Diện tích 445/820 ha đạt 54% KH, giai đoạn phát triển thân lá - hình thành củ.

- Diện tích trồng mới cây ăn quả: Cây cam, quýt 76/180 ha đạt 42% KH; cây mơ 62/160 ha đạt 39% KH.

- Các cây trồng khác: Cây lạc 263/260 ha đạt 101% KH, cây khoai môn 186/280 ha đạt 66% KH, cây khoai lang 274/200 ha đạt 137% KH, cây rau 1.667/1.500 ha đạt 111% KH, cây đậu đỗ 278/300 ha đạt 93% KH, cây đậu tương 208/170 ha đạt 122% KH, cây mía 87/70 ha đạt 124% KH, cây gừng 188/300 ha đạt 63% KH, cây nghệ 101/125 ha đạt 80% KH,...

2. Tình hình dịch hại

- Cây lúa:

+ Ốc bươu vàng, mật độ hại phổ biến 1 - 3 con/m², cao 8 - 12 con/m², cá biệt 25 con/m²; tổng diện tích nhiễm 55 ha (nhiễm mới 36 ha) tại huyện Chợ Mới, Pác Nặm, Bạch Thông, Thành phố, trong đó nhiễm nhẹ 28 ha, nhiễm trung bình 19 ha, nhiễm nặng 8 ha; bà con nông dân đã phun trừ phòng được 129 ha.

+ Bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ trên giống BC15 tại huyện Pác Nặm, tỷ lệ bệnh hại cá biệt 10% lá; diện tích nhiễm nhẹ 0,2 ha (nhiễm mới 0,1 ha), bà con nông dân đã phun trừ được 0,1 ha.

+ Bọ rầy, sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ rải rác.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại mật độ cá biệt 4 con/m², sâu đang tuổi 1-2. Tổng diện tích nhiễm nhẹ 1,5 ha tại huyện Chợ Mới; bà con nông dân phòng trừ sâu bằng các biện pháp thủ công.

- Trên các cây trồng khác: Sâu bệnh gây hại nhẹ, rải rác, mật độ sâu và tỷ lệ bệnh hại không đáng kể.

- Châu chấu tre lưng vàng gây hại mật độ phổ biến 80-100 con/m², cao > 300 con/m², tổng diện tích rừng vầu bị hại khoảng 500 ha, chưa phát hiện gây hại trên cây trồng nông nghiệp. UBND xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn phun trừ khoanh vùng những khu vực giáp ranh với cây trồng nông nghiệp bằng máy phun dạng khói được khoảng 50ha.

III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TUẦN TỚI

1. Cây lúa

- Lúa mùa

+ Mùa sớm: Điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện để cho rễ mọc dài, tỏa rộng và bám sâu tăng khả năng hút dinh dưỡng.

+ Mùa chính vụ: Tiếp tục cấy những diện tích còn lại, cấy khi mạ đạt 2-3 lá tiến hành. Trước khi cấy cần bón lót với lượng phân tính cho 1.000 m²: Phân chuồng hoai mục 800 - 1.000 kg + 40 - 50 kg phân lân. Nếu đất chua bón thêm 40 - 50 kg vôi bột. Khi lúa hồi xanh – đẻ nhánh, tiến hành bón thúc lần 1 (thúc đẻ nhánh) khi cây lúa bén rễ - hồi xanh (sau cấy 5-7 ngày), kết hợp làm cỏ, sục bùn, lượng phân bón tính cho 1.000 m²:

Đối với lúa thuần: Bón 12 - 14 kg đạm urê + 4 - 5 kg kali clorua.

Đối với lúa lai: Bón 16 - 18 kg đạm urê + 5 - 6 kg kali clorua.

- Chú ý phòng trừ bệnh nghệt rễ, bệnh đạo ôn, ốc bươu vàng và bọ rầy gây hại trên những diện tích lúa mới cấy – hồi xanh, đẻ nhánh.

2. Cây ngô

- Vụ xuân: Phát quang bờ bụi hạn chế chuột gây hại, tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch, đồng thời tiến hành công tác vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây trồng trên đồng ruộng để tiếp tục gieo trồng vụ mùa.

- Vụ mùa: tiếp tục làm đất trồng những diện tích còn lại

Chú ý phòng trừ Sâu keo mùa thu: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, ngắt ổ trứng đem tiêu hủy, sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng pha loãng đổ vào nõn cây ngô diệt sâu non, khi mật độ cao sử dụng một trong các loại thuốc như Enasin 32WP, Bitadin WP, Match 050EC.... để phun trừ khi sâu còn tuổi nhỏ.

3. Cây dong riềng: Phát quang bờ bụi, cắt tỉa lá già và chú ý phòng trừ bệnh thối thân, bệnh cháy lá ... gây hại

4. Cây cam quýt

Chú ý phòng trừ *bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa, sâu đục thân, bọ xít xanh* ... gây hại.

5. Châu chấu tre lưng vàng: Tiếp tục điều tra, theo dõi tình hình gây hại và di chuyển của đàn châu chấu. Đặc biệt chú ý những diện tích lúa, ngô, dong riềng ven rừng có nguy cơ châu chấu gây hại.

Biện pháp phun trừ:

+ Phát quang đồi rừng xung quanh diện tích lúa, ngô, dong riềng ven rừng có nguy cơ châu chấu gây hại.

+ Tùy từng điều kiện thực tế có thể phun trừ châu chấu bằng phương pháp phun thuốc bảo vệ thực vật dạng nước, dạng bột hoặc dạng khói. Sử dụng một trong các loại thuốc như: Victory 585EC, Lufen extra 1005EC, Neretox 95WP...

Trong quá trình tổ chức phòng trừ tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, phun đồng loạt, tập trung, trong khu vực phun thuốc tuyệt đối không được chần, thả gia súc, gia cầm./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);
- UBND các huyện, Thành phố;
- Cục Bảo vệ thực vật (B/c);
- Trung tâm BVTV Phía Bắc (B/c);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố (T/h);
- Phòng NN/Phòng kinh tế (P/hợp);

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Bá Quân