

THÔNG BÁO

Công tác Trồng trọt và BVTV 7 ngày

(Từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2019)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

- Nhiệt độ: Trung bình: 29°C cao: 35°C thấp: 23°C
- Ẩm độ: Trung bình: 80% cao: 90% thấp: 70%

Trong kỳ, thời tiết nắng mưa xen kẽ. Nhìn chung thuận lợi cho công tác gieo cấy và chăm sóc cây trồng vụ mùa, đồng thời là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây hại.

II. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VÀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI

1. Tiến độ sản xuất trồng trọt

- Cây lúa mùa: Diện tích cấy được khoảng 13.197/14.000 ha KH đạt 94%, trong đó:

Mùa sớm: Diện tích cấy được khoảng 1.736 ha, đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái.

Mùa chính vụ: Diện tích cấy được khoảng 11.461 ha, đang giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh, đẻ nhánh rộ.

- Cây ngô: Diện tích đã trồng 1.499/6.000 ha đạt 25% KH, đang giai đoạn trồng → 2-3 lá, riêng huyện Ngân Sơn đang giai đoạn chắc hạt – thu hoạch.

- Cây dong riềng: Diện tích 445/820 ha đạt 54% KH, giai đoạn phát triển thân lá - hình thành củ.

- Diện tích trồng mới cây ăn quả: Cây cam, quýt 76/180 ha đạt 42% KH; cây mơ 62/160 ha đạt 39% KH.

- Các cây trồng khác: Cây khoai môn 186/280 ha đạt 66% KH, cây mía 87/70 ha đạt 124% KH, cây gừng 188/300 ha đạt 63% KH, cây nghệ 101/125 ha đạt 80% KH,...

2. Tình hình dịch hại

- Cây lúa:

+ Ốc bươu vàng, mật độ hại phổ biến 1 con/m², cao 8 - 12 con/m², cá biệt 30 con/m²; tổng diện tích nhiễm 57,5 ha (nhiễm mới 21,5 ha) tại huyện Chợ

Mới, Pác Nặm, Bạch Thông, Thành phố, trong đó nhiễm nhẹ 33 ha, nhiễm trung bình 17,5 ha, nhiễm nặng 7 ha; bà con nông dân đã phun trừ được 153 ha.

+ Bệnh đạo ôn lá gây hại trên giống BC15, HKT99, nếp tại huyện Pác Nặm, Ngân Sơn; tỷ lệ bệnh hại cá biệt 10% lá; diện tích nhiễm nhẹ - trung bình 14,5 ha (nhiễm mới 14,4 ha), bà con nông dân đã phun trừ được 10,6 ha.

+ Bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại trên giống lúa lai tại huyện Ngân Sơn; tỷ lệ bệnh hại cao 10-20% lá; diện tích nhiễm nhẹ 3,2 ha.

+ Ruồi đục nõn gây hại trên các giống Khang dân 18, DV 108, Nhị ưu 838, Tạp giao 1; tỷ lệ hại phổ biến 2% dảnh, cao 5% dảnh, cá biệt 12% dảnh; diện tích nhiễm nhẹ 1,2 ha tại huyện Chợ Mới, bà con nông dân đã phun trừ được 1,5 ha.

+ Sâu đục thân gây hại trên các giống C70, PC6, BC15, GS9, Tạp giao, Nhị Ưu 838...; tỷ lệ hại cá biệt 10% dảnh; diện tích nhiễm nhẹ - trung bình 1,3 ha tại huyện Pác Nặm, Bạch Thông, bà con nông dân đã phun trừ được 02 ha.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại mật độ cá biệt 5 con/m², sâu đang tuổi 2-3; tổng diện tích nhiễm nhẹ 2 ha tại huyện Chợ Mới; bà con nông dân diệt trừ sâu bằng các biện pháp thủ công và phun thuốc hóa học toàn bộ diện tích nhiễm.

- Cây gừng: Bệnh thối nhũn củ gây hại tại huyện Chợ Mới, tỷ lệ hại phổ biến 2 %, cao 7 %, cá biệt 15 %; tổng diện tích nhiễm khoảng 6 ha, trong đó nhiễm nhẹ 3 ha, trung bình 2 ha, nặng 1 ha; một số hộ đã nhổ bỏ cây bị bệnh, rắc vôi xung quanh gốc bị bệnh.

- Cây khoai môn: Bệnh cháy lá gây hại nhẹ tại huyện Chợ Mới, tỷ lệ phổ biến 2 %, cao 5 %, cá biệt 12 %; diện tích nhiễm nhẹ 1 ha.

- Cây cam quýt: Nấm (*chưa rõ tên nấm*) gây hại 0,2ha tại Thành phố Bắc Kạn, tỷ lệ cá biệt 20% diện tích; bà con nông dân đã phun trừ toàn bộ diện tích bị hại.

- Châu chấu tre lưng vàng gây hại mật độ phổ biến 80-100 con/m², cao > 300 con/m², tổng diện tích rừng vầu bị hại khoảng 500 ha, chưa phát hiện gây hại trên cây trồng nông nghiệp. UBND xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn phun trừ khoanh vùng những khu vực giáp ranh với cây trồng nông nghiệp bằng máy phun dạng khói được khoảng 50ha.

III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TUẦN TỚI

1. Cây lúa

- Mùa sớm: Hướng dẫn bón thúc lần 2 (bón đón đòng) khi lúa xuất hiện khô sơ khởi, giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm, lượng phân tính cho 1.000m².

Đối với lúa thuần: bón 6 – 8 kg Phân đạm urê + 10 - 11 kg Kali.

Đối với lúa lai: bón 7 – 9 kg Phân đạm urê + 12 - 13 kg Kali.

- Mùa chính vụ:

+ Tiếp tục bón thúc lần 1 (thúc đẻ nhánh) khi cây lúa bén rễ - hồi xanh (sau cấy 5-7 ngày), kết hợp làm cỏ, sục bùn, lượng phân bón tính cho 1.000 m²:

Đối với lúa thuần: Bón 12 - 14 kg đạm urê + 4 - 5 kg kali clorua.

Đối với lúa lai: Bón 16 - 18 kg đạm urê + 5 - 6 kg kali clorua.

+ Điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện để cho rễ mọc dài, tỏa rộng và bám sâu tăng khả năng hút dinh dưỡng.

- Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân, ruồi đục nõn, ốc bươu vàng.

+ Bệnh đạo ôn lá: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện bệnh dừng bón đạm, không phun thuốc kích thích. Duy trì mức nước trong ruộng vừa phải (3-4 cm); sử dụng 1 trong những loại thuốc như Kasai 21,2WP, Kabeam 75WP, Beam 75WP, Fuji-one 40EC. Nếu bệnh gây hại nặng cần phun kép 2 lần, cách nhau 5 -7 ngày.

+ Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Khi bệnh xuất hiện, dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và duy trì mức nước trong ruộng 3-4 cm. Khi bệnh phát triển trên đồng ruộng với triệu chứng rõ ràng thì việc phun thuốc thường kém hiệu quả. Tuy nhiên, tại những vùng có nguy cơ cao có thể phun phòng bằng một trong các loại thuốc như: Linacin 40SL, Xanthomix 20 WP, Starner 20WP, Kasumin 2L,...

+ Sâu đục thân: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, với những diện tích đang có ổ trứng, tiến hành ngắt ổ trứng, khi mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m² tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc Patox 95SP, Gà Nòi 95SP, Voliam Targo 063SC...

Với những diện tích đang có sâu non gây hại, tiến hành ngắt danh héo, phun trừ bằng các loại thuốc; Patox 95SP, Gà Nòi 95SP, Voliam Targo 063SC, hoặc rải một trong các loại thuốc dạng hạt như Vibam 5H, Vibasu 10H ... để trừ sâu. Chú ý: Cần duy trì mức nước 3 - 4 cm khi rải thuốc trong 3 - 5 ngày.

2. Cây ngô

Tiếp tục làm đất trồng những diện tích còn lại, bón phân thúc lần 1 khi cây 3 - 4 lá kết hợp làm cỏ, vun gốc, lượng phân bón tính cho 1.000 m²: 8 - 10 kg đạm + 4 - 6 kg kali.

Chú ý phòng trừ Sâu keo mùa thu: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, ngắt ổ trứng đem tiêu hủy, sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng pha loãng đổ vào nõn cây ngô diệt sâu non, khi mật độ cao sử dụng một trong các loại thuốc như Enasin 32WP, Bitadin WP, Match 050EC.... để phun trừ khi sâu còn tuổi nhỏ.

3. Cây dong riềng: Phát quang bờ bụi, cắt tỉa lá già và chú ý phòng trừ bệnh thối thân, bệnh cháy lá ... gây hại

4. Cây cam quýt

Chú ý phòng trừ *bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa, sâu đục thân, bọ xít xanh ...* gây hại.

5. Châu chấu tre lưng vàng: Tiếp tục điều tra, theo dõi tình hình gây hại và di chuyển của đàn châu chấu. Đặc biệt chú ý những diện tích lúa, ngô, dong riềng ven rừng có nguy cơ châu chấu gây hại.

Biện pháp phun trừ:

+ Phát quang đồi rừng xung quanh diện tích lúa, ngô, dong riềng ven rừng có nguy cơ châu chấu gây hại.

+ Tùy từng điều kiện thực tế có thể phun trừ châu chấu bằng phương pháp phun thuốc bảo vệ thực vật dạng nước, dạng bột hoặc dạng khói. Sử dụng một trong các loại thuốc như: Victory 585EC, Lufen extra 1005EC, Neretox 95WP...

Trong quá trình tổ chức phòng trừ tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, phun đồng loạt, tập trung, trong khu vực phun thuốc tuyệt đối không được chần, thả gia súc, gia cầm./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);
- UBND các huyện, Thành phố;
- Cục Bảo vệ thực vật (B/c);
- Trung tâm BVTV Phía Bắc (B/c);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố (T/h);
- Phòng NN/Phòng kinh tế (P/hợp);

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Nông Đình Khuê