

**THÔNG BÁO**  
**Công tác Trồng trọt và BVTV 7 ngày**

(Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019)

**I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT**

- Nhiệt độ: Trung bình: 25°C                      cao: 32°C                      thấp: 20°C
- Ẩm độ: Trung bình: 70%                      cao: 80%                      thấp: 61%

Trong kỳ, thời tiết âm u, nắng nhẹ xen kẽ có mưa nhỏ. Nhìn chung thuận lợi cho thu hoạch cây trồng vụ mùa và gieo trồng cây vụ đông.

**II. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VÀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI**

**1. Tiến độ sản xuất trồng trọt**

**\* Vụ mùa:**

- Cây lúa:

Mùa sớm: Diện tích 1.736 ha, đã thu hoạch xong.

Mùa chính vụ: Diện tích 12.688 ha, giai đoạn ngâm sữa - thu hoạch. Giống ngắn ngày đã thu hoạch được khoảng 2.530 ha đạt 20% diện tích lúa mùa chính vụ (những diện tích còn lại cơ bản là giống bao thai và nhóm giống dài ngày).

Ngoài ra, diện tích lúa nương: 85 ha

- Cây ngô: Diện tích đã trồng 5.466/6.000 ha đạt 91% KH, những diện tích trồng sớm đang giai đoạn chắc hạt - chín, diện tích trồng muộn đang giai đoạn xoáy nõn – đóng bắp, tạo hạt.

- Cây dong riềng: Diện tích 468/820 ha đạt 57% KH, giai đoạn tích lũy tinh bột.

- Cây ăn quả:

- + Diện tích trồng mới: Cây cam, quýt 143/180 ha đạt 79% KH; cây hồng không hạt 27/60 ha đạt 45% KH; cây mơ 87/160 ha đạt 54% KH.

- + Diện tích thâm canh, cải tạo: Cây cam quýt 503/500 ha đạt 101% KH, cây hồng không hạt 33/150 ha đạt 22% KH, cây mơ 25/65 ha đạt 38% KH.

- Các cây trồng khác: Cây khoai môn 186/280 ha đạt 66% KH, cây mía 87/70 ha đạt 124% KH, cây gừng 188/300 ha đạt 63% KH, cây nghệ 101/125 ha đạt 80% KH, khoai lang 253/275 ha đạt 92% KH, rau các loại 1.216/1.200 ha đạt 101% KH, đậu tương 388/500 ha đạt 78% KH, lạc 277/300 ha đạt 92 KH, đậu đỗ 393/480 ha đạt 82% KH.

- Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 222/342 ha, đạt 65% KH; duy trì diện tích đã chuyển đổi năm 2018 là 1.386 ha, đạt 100% KH.

#### **\* Vụ đông**

- Cây khoai tây: Đã trồng được 5/138 ha.

- Cây ngô: Đã trồng được 60/255 ha.

- Cây khoai lang: Đã trồng được 35/132 ha.

- Cây rau: Đã trồng được 145/965 ha.

Bà con nông dân đang làm đất tiếp tục gieo trồng đạt kế hoạch giao.

### **2. Tình hình dịch hại**

- Cây lúa: Cuối vụ sâu, bệnh gây hại giảm cả về thành phần và mức độ gây hại, cá biệt:

+ Bọ xít dài gây hại cục bộ tại huyện Pác Nặm với tỷ lệ cá biệt 6 con/m<sup>2</sup>, diện tích nhiễm nhẹ 1 ha.

+ Chuột gây hại cục bộ tại huyện Pác Nặm chuột hại với tỷ lệ cao 40% dành, tổng diện tích nhiễm 15,5 ha, trong đó nhiễm nhẹ - trung bình 13 ha, nhiễm nặng 2,5 ha.

- Cây hồi: Bệnh thán thư gây hại tỷ lệ bệnh phổ biến 3% lá, cao 13% lá, cá biệt 33%; diện tích nhiễm nhẹ - trung bình 60 ha tại các thôn của xã Bình Văn, huyện Chợ Mới; diện tích đã phun trừ bằng máy phun khói được khoảng 70 ha, những diện tích phun trừ đang ra lá mới tỷ lệ bệnh giảm (giảm so với kỳ trước 20 ha).

- Các cây trồng khác: Sâu, bệnh gây hại nhẹ, rải rác.

## **III. CÔNG TÁC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TUẦN TỚI**

### **1. Cây lúa**

- Đối với những diện tích giai đoạn thu hoạch: Tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch những diện tích còn lại, tuyệt đối không phơi trên gốc rạ.

- Giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm đối với trà lúa Bao thai đến khi lúa chín đỏ đuôi.

- Chú ý phòng trừ chuột gây hại.

### **2. Cây ngô**

- Ngô mùa: Phát quang bờ bụi hạn chế chuột gây hại.

- Ngô đông: Chú ý phòng trừ Sâu keo mùa thu, sâu xám gây hại.

Phòng trừ Sâu keo mùa thu: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng loãng đổ vào nỗng ngô diệt sâu non. Khi mật độ sâu cao sử dụng một trong các loại thuốc như: Enasin 32WP, Bitadin WP, Match 050EC.... để phun trừ.

**3. Cây dong riềng:** Phát quang bờ bụi, cắt tỉa lá già và chú ý phòng trừ bệnh thối thân, bệnh cháy lá gây hại đối với những diện tích trồng muôn.

**4. Cây cam quýt:** Chăm sóc, phát quang vườn, chú ý phòng trừ: *Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa, sâu đục thân, ngài chích quả, ruồi vàng đục quả* gây hại.

### **5. Cây lâm nghiệp**

- Bệnh thán thư hại cây hồi: Mở rộng điều tra, đặc biệt chú ý những diện tích nhiễm bệnh năm trước và tổ chức phun trừ kịp thời những diện tích nhiễm bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh rừng hồi đang bị bệnh gây hại, tiêu hủy những cành lá bị bệnh rụng xuống để tránh bệnh lây lan ra diện rộng.

Tiến hành phun trừ bằng biện pháp phun khói: Sử dụng thuốc Revus Opti 440SC, bệnh nặng phun 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày hoặc sử dụng một trong các loại thuốc như Ridomil MZ 72WP, Daconil 75WP, Ridomil Gold 68WG, Hope 20SL... để phun ở những diện tích thuận lợi nguồn nước và gần nhà dân.

- Cây vầu: Tiếp tục theo dõi châu chấu di chuyển và gây hại, xác định vị trí tập trung để trúng để chủ động phòng trừ các đợt gây hại tiếp theo./.

#### **Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);
- UBND các huyện, Thành phố;
- Cục Bảo vệ thực vật (B/c);
- Trung tâm BVTV Phía Bắc (B/c);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Trung tâm DVNN các huyện, TP (T/h);
- Phòng NN/Phòng kinh tế (P/hợp);

*Gửi bản giấy:*

- Lưu: VT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Hoàng Thanh Bình**